

Holambra, 01 de dezembro de 2017

Prezado (a) Sojicultor (a),

Considerando a **identificação precoce da ferrugem asiática da soja** nesta safra, os **atrasos no plantio** em função das chuvas e o atual cenário de **evolução da redução de sensibilidade** desta doença aos grupos químicos de mecanismo de ação específico mais utilizados hoje, o FRAC-BR vem através deste alerta-lo quanto a necessidade de adoção de boas práticas de manejo:

- Esteja atento ao monitoramento constante das doenças da soja, especialmente a ferrugem, e realize as aplicações em intervalos adequados seguindo as recomendações do fabricante;
- Realize a aplicação dos fungicidas de forma preventiva, **sempre** em associação com fungicidas multissítios;
- Utilizar sempre **misturas comerciais** formadas por **dois ou mais fungicidas** com mecanismos de ação distintos;
- Rotacione fungicidas com diferentes mecanismos de ação (Triazóis, Estrobilurinas, Carboxamidas, Morfolinas e Multissítios.)
- Não ultrapasse o número máximo de 2 (duas) aplicações de fungicidas de mecanismo de ação específico no mesmo ciclo de cultivo;
- Utilize tecnologia de aplicação adequada
- Não plante soja “safrinha”
- Respeite o vazio sanitário e elimine as plantas voluntárias remanescentes em lavouras e beiras de estrada (guaxas)
- Procure realizar o plantio na época recomendada, utilizando variedades de ciclo mais curto e se possível, com tolerância genética frente à doença;
- Realize a rotação de culturas;

Estas recomendações são essenciais para se preservar a manutenção da eficácia dos fungicidas, uma tecnologia indispensável para o cultivo da soja no Brasil.

Uma excelente safra a todos!

Para maiores informações consulte www.frac-br.org

Atenciosamente,

FRAC Brasil